

دراسة لمراقبة ما بعد تسويق يوكاربون® Eucarbon®

”يوكاربون“ EUCARBON® فقد تمّ تقييمها بالجيدة جداً من قبل اكثر من 80% من الاطباء والمرضى.

- بعد مرور 6 أسابيع

بعد اخذ علاج ”يوكاربون“ EUCARBON® تمّت في الواقع ملاحظة تحسّن سريري ملحوظ على أعراض المرض مثل (الامساك، براز صلب، الاحساس بعدم التفرغ الكامل للمعي، التّطبّل، والغازات والالام) وذلك حسب مقياس ”مان- وتني“ المُخصّص لهذا القياس وبعد مرور 12 أسبوعاً تمّت ملاحظة تحسّن سريري ملحوظ

ايضاً في أعراض ضغط عضلات البطن على- نفس المقياس- وخلال مدّة دراسة المراقبة لما بعد التسويق تحسّن التقييم الشامل للصورة السريرية لدى المرضى-

بنفس المقياس- بشكل ملحوظ. كما يظهر في الرسم رقم 1. وكانت التأثيرات الجانبية الغير مرغوب فيها نادرة الحدوث، اذ سجّل 3 مرضى فقط (بعد مرور 6 أسابيع) و8 مرضى فقط (بعد مرور 12 اسبوعاً) وذلك من مجموع 399 مريضاً حالات مثل آلام في الرأس والاسهال والحرقرة والشعور بالامتلاء والتجشؤ.

الاستنتاجات:

لقد أظهر ”يوكاربون“ EUCARBON® انه علاج جيد وفعال للمرضى الذين يعانون من اضطرابات معدية معوية ومن (متلازمة المعى المتهيّج) وانه قليل التأثيرات الجانبية ومناسب للاستعمال اليومي.


إن هدف مراقبة ما بعد تسويق منتج ”يوكاربون“ EUCARBON® هو التحقق من فعالية اقرص ”يوكاربون“ EUCARBON® والقدرة على احتمالها لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل واضطرابات معدية معوية أو من (متلازمة المعى المتهيّج) (IBS: Irritable Bowel Syndrome)

اسلوب المراقبة

لقد تمّ توثيق فعالية العلاج ”يوكاربون“

EUCARBON® والقدرة على احتمالها على مدى 6 أو 12 أسبوعاً وذلك على يد أطباء عامين وعلى 399 مريضاً ”مجرباً“ يعانون من اضطرابات معدية / معوية متوسط العمر بين 18 و 47 عاماً، بينهم 65% من النساء و 31 من المدخنين و 21% من مستهلكي الكحول بانتظام).

الرسم رقم 1



النتائج

لقد تناول المرضى جرعة بمعدل 3 أقراص يومية من ”يوكاربون“ EUCARBON®. وقد كان تقييم فعالية ”يوكاربون“ EUCARBON® من قبل ثلثي الاطباء والمرضى بالجيد جداً أو بالجيد أمّا القدرة على احتمال



لمزيد من المعلومات
زوروا موقعنا الالكتروني:

www.eucarbon.com