

EUCARBON®- схемы дозировок:

- При *низких дозах* по 1-3 таблетки в день EUCARBON® действует как адсорбент – показан при различных нарушениях образования газов(диспепсия, метеоризм)
- При *высоких дозах* по 4-6 таблеток в день, EUCARBON® действует как адсорбент и слабительное и показан при запорах(временные и хронические), геморроях и анальных трещинах
- Если лечение следует проводить в среднем 4 – 5 недель, EUCARBON® становится кишечным регулятором. Это считается важным моментом при лечении функциональной колонопатии (I.B.S.), который направлен на урегулирование кишечного транзита.

Эфирные масла мяты перечной и фенхеля добавляют спазмолитический и ветрогонный эффект.Из-за поглощения и устранения газов, напряженность брюшины и боль,сопровождаемая напряженностью, также уменьшаются.

Однако пациентам следует учесть, что:

- лечение займет в среднем 4 - 5 недель, или пока не будет достигнуто урегулирования кишечного транзита.
- дозировка должна быть снижена, в соответствии с улучшениями кишечного транзита который определяется консистенцией стула:
как только появится склонность к диарее или если каловые массы станут жидкими, это будет означать улучшение транзита, и потребует последовательного сокращения дозы, пока не будет достигнута стабилизация кишечного транзита.Преуспев в этом пациент впоследствии только должен будет принимать одну или две таблетки в случае критического положения, чтобы восстановить регуляцию кишечного транзита.

EUCARBON® следует принимать *во время или после еды*, запивая большим количеством воды.

Синдром раздраженного кишечника с предшествующим запором

2 таблетки 3 раза в день – принимаются в течение одного или двух дней пока запор не будет устранен;

1 таблетка 3 раза в день - 7-10 дней в случае улучшения транзита(показателем является консистенция стула)с последующим сокращением дозировки до:

1 таблетки 2 раза в день – в случае дальнейшего улучшения:

1 таблетка 1 раз в день.

- **Продолжительность лечения:**

В среднем 4 - 5 недель, или пока не будет достигнуто урегулирование кишечного транзита. Если пациент прерывает лечение после 1 или 2 недель, он конечно почувствует улучшение, но он скоро возвратится к начальной точке, т.е. все симптомы вновь возобновятся

- **Сокращение дозы:**

С увеличивающимся улучшением кишечного транзита пациент должен будет снизить дозировку. Улучшение транзита отражается в консистенции стула. Как только стул становится немного жидким (или если отмечена небольшая тенденция к диарее), значит, транзит улучшился, и дозировка может быть постепенно снижена, пока не будет достигнуто урегулирование кишечного транзита.

- **Результат регулирования кишечного транзита, полученный таким образом, будет следующим:**
 - исчезновение симптомов
 - I.B.S. все еще существует потому что это хроническое заболевание

Как только кишечный транзит будет урегулирован, пациенты поймут, что приема одной или двух таблеток EUCARBON® будет достаточно, если необходимо, для восстановления регулярного кишечного транзита.

Функциональная колонопатия(I.B.S.): сопровождаемая запором:

3 таблетки 2 раза в день – в течение 2 дней;

как только запор будет устранен:

1 таблетке 3 раза в день – в течение 7-10 дней;

Снижайте дозировку согласно улучшению кишечного транзита.

Улучшение кишечного транзита отображается на небольшом сжижении фекалий.

Снижайте дозировку до:

1 таблетки – утром, 1 таблетки – вечером - в течение 7 -10 дней

Снова сократите дозу:

1 таблетка в день.

Прекратите лечение сразу после урегулирования кишечного транзита. Для поддержания нормального кишечного транзита принимайте по 1 -2 таблетки в день, если необходимо.

Лечение хронических запоров и I.B.S.

В случае хронического запора:

2 таблетки 3 раза в день будут всегда оказывать слабительный эффект. Можно рекомендовать принимать:

2 таблетки - утром;

2 таблетки - в полдень;

3-4 таблетки перед сном.

Пациенты, не страдающие запорами, но страдающие частыми расстройствами желудка, сопровождаемые признаками функционального нарушения кишечника:

лечение начинается с приема 1 таблетки 3 раза в день, и сокращением дозы в пропорции к улучшению пищеварительной функции. Показателем для сокращения дозы является консистенция стула. Как только стул становится жидким, то есть похожий на диарею, может предполагаться, что прохождение через кишечник улучшилось, и что доза должна быть уменьшена:

до 2 таблеток 1 раз в день.

Эта процедура продолжается до урегулирования функции кишечника.

Пациенты, страдающие запорами в течение нескольких дней:

в этом случае первым шагом является достижение облегчения перед началом регулирования функции кишечника.

лечение начинают с 2 таблеток 3 раза в день в течение двух дней в среднем пока не будет очищен кишечник. Как только это будет достигнуто, мы можем начать пробовать стабилизировать функцию кишечника.

Примечание: В случае функциональных расстройств один день напряжения (стресса) или только маленькая поездка (изменение климата или диеты) может закончиться повторением расстройства. В таких случаях (функциональные расстройства) тенденция к запору вновь появилась бы, но если ранее было достигнуто успешное урегулирование кишечника, одна единственная таблетка даст желаемый результат.

EUCARBON® это доказанная помощь при пищеварении, также как и умеренное слабительное, которое делает его идеальным кишечным регулятором.

Рентгенологические исследования

Устранение газов, а также и полная очистка кишечной системы являются главными Целями в подготовке пациентов к рентгенологическому исследованию.

Для подготовки пациентов к рентгенологическому исследованию существуют 3 метода, в зависимости от того, сколько времени имеется в вашем распоряжении:

3 дня до исследования:

3 таблетки 3 раза в день - в течение 3 дней

Только 1 день:

4 таблетки – утром и 4 таблетки - на ночь

В экстренных случаях, когда в запасе нет даже одного дня:

6–8 таблеток - 1 раз вечером перед исследованием, перед сном.

Чем меньше времени имеется в запасе, тем, выше будет дозировка.

Три вышеуказанных метода показывают тот же самый результат, т.е.:

- полное устранение газов,
- полную очистку кишечной системы.
- четкие и легко читаемые фотографии рентгенологического исследования

Ультразвуковое исследование

Необходимо подготовить пациента, чтобы устранить газы, которые могли бы препятствовать видимости поджелудочной железы и установлению диагноза аденопатии:

6-8 таблеток EUCARBON® принимаются одновременно накануне исследования

или

**2 таблетки EUCARBON® - утром
в полдень
вечером в течение 3-4 дней.**

Колоноскопия

**2 таблетки EUCARBON® утром и вечером в течение 7 дней перед исследованием
и 6-8 таблеток сразу накануне исследования**

Внутривенная урография

Очистка кишечника, чтобы избежать наложения, вызванного газообразным растяжением на почечном уровне.

6-8 таблеток EUCARBON® накануне исследования

N.B.: помните, что 6-8 таблеток EUCARBON® следует запивать большим количеством воды!